

Aporil, solution pour application cutanée

Teinture de thuya 45 mg/g, Teinture de chélidoine 45 mg/g, Acide salicylique 135 mg/g, Acide lactique 20 mg/g, Acide acétique 80 mg/g

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.



- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après quelques semaines.

Que contient cette notice ?:

1. Qu'est-ce que Aporil et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Aporil
3. Comment utiliser Aporil
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Aporil
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE APORIL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ

Aporil est utilisé pour traiter les verrues et les cors. Aporil ne peut pas être utilisé pour traiter des verrues sur le visage ou les parties génitales.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER APORIL

N'utilisez jamais Aporil

- Si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Évitez tout contact avec les yeux, les muqueuses, les plaies ouvertes et la peau irritée enflammée ou infectée.
- Le produit ne doit pas être utilisé sur le visage ou sur les parties génitales.

- Ce produit ne convient pas pour les verrues ayant un aspect anormal (verrues à bords rouges, de couleur inhabituelle ou parsemées de poils) ni pour les grains de beauté.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Aporil.

- Évitez tout contact avec les yeux, les plaies et les muqueuses. En cas de contact avec les yeux, une plaie ou les muqueuses, rincer abondamment à l'eau.
- Éviter toute utilisation prolongée ou répétée de même que toute application sur une surface cutanée plus étendue (plus de 5 cm²).
- Il existe un risque d'intoxication par salicylates en cas de surdosage ou d'utilisation sur une surface cutanée plus étendue, notamment chez les enfants.
- L'utilisation d'Aporil n'est pas recommandée chez les patients diabétiques ni chez les personnes présentant un dysfonctionnement des nerfs.
- Tout contact avec la peau saine peut provoquer une irritation cutanée. Le traitement doit être arrêté en cas d'irritation cutanée extrême. La peau saine autour des verrues peut être protégée par l'application d'une mince couche de vaseline.
- Conservez le produit loin des sources de chaleur pendant l'utilisation, car il est très inflammable.
- L'usage d'Aporil n'est pas recommandé chez les enfants ou les adolescents pendant ou juste après la varicelle, la grippe ou toute autre infection virale.
- Si vous utilisez d'autres médicaments. Veuillez également lire la rubrique «Autres médicaments et Aporil».

Veillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

Enfants

Le traitement avec Aporil n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 2 ans. Chez les enfants de 2 à 4 ans, la prudence est de mise, et il est recommandé d'appliquer le produit une seule fois par jour.

Autres médicaments et Aporil

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

- La présence d'eau augmente fortement l'action corrosive.
- Éviter tout usage simultané d'autres traitements locaux. Associé à l'oxyde de zinc, l'acide salicylique forme du salicylate de zinc, inactif d'un point de vue pharmacologie.

Aporil avec des aliments, boissons et de l'alcool

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Aucun effet pendant la grossesse n'est attendu. Aporil peut être utilisé pendant la grossesse. Il est toutefois recommandé d'informer le médecin traitant de toute utilisation du produit.

Allaitement

Aucun effet chez les nourrissons n'est attendu. Aporil peut être utilisé pendant l'allaitement pourvu qu'il ne soit pas appliqué à proximité de la poitrine. Il est recommandé d'informer le médecin traitant de toute utilisation du produit.

Fertilité

Il n'y a pas de données pertinentes disponibles sur la fertilité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

3. COMMENT UTILISER APORIL

Veillez toujours à utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Le flacon est fermé par une fermeture de sécurité enfant qui doit être ouverte comme suite: poussez sur le bouchon à visser en plastique tout en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (voir figure).



La dose recommandée est de:

Secouer avant usage. Appliquer une goutte d'Aporil sur la verrue ou le cor, 1 à 2 fois par jour à l'aide de la petite tige. Laisser sécher jusqu'à formation d'une pellicule. Veillez à bien et rapidement refermer le flacon afin d'éviter toute évaporation du produit. Oter toujours l'ancienne pellicule avec de l'éther ou de l'alcool.

Veiller à ne pas mettre la peau saine en contact avec la solution. La peau saine autour des verrues ou des cors peut être protégée par l'application d'une mince couche de vaseline.

En cas d'utilisation sur des verrues ou des cors dans un pli cutané :

- Laissez sécher la pellicule
- Recouvrez ensuite la verrue ou le cor d'un sparadrap pour protéger la peau saine "sur l'autre bord" du pli cutané.

Votre médecin ou votre pharmacien vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser Aporil. Le traitement peut durer jusqu'à 12 semaines ou jusqu'à complète disparition de la verrue ou du cor et restauration complète de la peau. En cas de persistance de la verrue ou du cor au-delà de 12 semaines de traitement, de verrue ou de cor plus étendu (plus de 5 cm²) ou d'irritation de la peau, veuillez consulter un médecin ou un pharmacien.

Utilisation chez les enfants

Le traitement avec Aporil n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 2 ans. Chez les enfants de 2 à 4 ans, la prudence est de mise, et il est recommandé d'appliquer le produit une seule fois par jour.

Si vous avez utilisé plus d'Aporil que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé ou pris trop d'Aporil, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Symptômes:

En cas de surdosage ou de traitement d'une surface cutanée plus étendue, notamment chez les enfants, il existe un risque d'intoxication par salicylates se traduisant notamment par des vomissements, déshydratation, fatigue, respiration accélérée, acouphènes, surdité, léthargie, convulsions, confusion, ...

L'ingestion accidentelle peut provoquer des lésions au niveau des parois de la gorge ou des symptômes d'intoxication par salicylates. L'ingestion d'un flacon peut être mortelle chez les enfants.

Traitement:

Après ingestion ou en cas de symptômes d'intoxication par salicylates, l'hospitalisation en urgence s'impose. Ne pas provoquer le vomissement après l'ingestion. Il est recommandé d'administrer du charbon actif dans l'heure qui suit l'ingestion d'Aporil. Le traitement de l'intoxication par salicylates est principalement symptomatique.

En cas d'exposition excessive de la peau lésée ou non, laver la peau abondamment à l'eau et au savon.

En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux à l'eau pendant 15 minutes. Consultez un ophtalmologue en cas de douleurs, de baisse de la vue ou d'irritation persistante après avoir rincé les yeux.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Très fréquent:

- Irritation cutanée. Dans ce cas, arrêtez le traitement immédiatement.
- Lésions cutanées. À soigner minutieusement pour éviter toute infection.
- L'utilisation du produit en trop grande quantité peut provoquer des brûlures, en particulier lorsqu'il est appliqué sur une peau fine (par ex. retour de la main).

Fréquence indéterminée:

- Réactions allergiques. Dans ce cas, arrêtez le traitement immédiatement.
- Il existe un risque d'intoxication par salicylates en cas de surdosage ou d'utilisation sur une surface cutanée plus étendue, notamment chez les enfants.

- Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via:

Belgique

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Division Vigilance - EUROSTATION II -
Place Victor Horta, 40/ 40 - B-1060 Bruxelles - Site internet: www.afmps.be - e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Luxembourg

Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des Médicaments - Villa Louvigny - Allée Marconi -
L-2120 Luxembourg - Site internet:
<http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER APORIL

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. A conserver à une température ne dépassant pas 25 ° C. A conserver dans l'emballage d'origine, loin des sources de chaleur. Aporil est très inflammable. Après utilisation, refermez bien et rapidement le flacon afin d'éviter toute évaporation du produit. N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette/l'emballage après « EXP ». Les deux premiers chiffres indiquent le mois, les deux ou quatre derniers l'année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Aporil

- Les substances actives sont la teinture de thuya, la teinture de chélidoine, l'acide salicylique, l'acide lactique, l'acide acétique.
- L'autre composant est le collodion élastique.

Aspect d'Aporil et contenu de l'emballage extérieur

Aporil est disponible dans un flacon fermé en verre brun contenant 10 ml de liquide et dont le bouchon sécurité enfant est pourvu d'une tige.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - Belgique

Numéro d'autorisation de mise sur le marché:

276 S43 F11

Mode de délivrance: Délivrance libre.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 10/2019.