



**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.  
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Titulaire / Exploitant / Fabricant



**LEHNING**  
LABORATOIRES

Laboratoires Lehning  
3 rue du Petit Marais  
57640 Sainte-Barbe, France

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 48 heures.

#### **Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que L107, solution buvable en gouttes et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser L107, solution buvable en gouttes ?
3. Comment utiliser L107, solution buvable en gouttes ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver L107, solution buvable en gouttes ?
6. Informations supplémentaires.

#### **1. QU'EST-CE QUE L107, solution buvable en gouttes ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

**L107, solution buvable en gouttes** est un médicament homéopatique traditionnellement utilisé dans le traitement adjuvant des gastro-entérites aiguës.

#### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER L107, solution buvable en gouttes ?** **N'utilisez jamais L107, solution buvable en gouttes :**

- Enfants de moins de 30 mois.
- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'un des composants.

#### **Mises en garde et précautions d'emploi**

- Chez l'enfant le diagnostic, l'initiation et le suivi du traitement d'une gastro-entérite aiguë doivent être assurés par le médecin.
- Ce médicament contient 45 % de vol d'éthanol (alcool), c'est-à-dire jusqu'à 89 mg par dose (10 gouttes), ce qui équivaut à 2,2 ml de bière, 0,9 ml de vin par dose chez l'adulte et jusqu'à 27 mg par dose (3 gouttes), ce qui équivaut à 0,7 ml de bière, 0,3 ml de vin par dose chez l'enfant.
- L'utilisation de ce médicament est dangereuse chez les sujets alcooliques et doit être prise en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.

#### **Autres médicaments et L107, solution buvable en gouttes**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez

récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

#### **L107, solution buvable en gouttes avec des aliments, boissons et de l'alcool**

Ce médicament est à prendre à distance des repas.

#### **Grossesse et allaitement**

En l'absence de données expérimentales et cliniques, et par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement.

#### **L107, solution buvable en gouttes contient de l'éthanol.**

#### **3. COMMENT UTILISER L107, solution buvable en gouttes ?**

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

#### **Posologie**

Réservé à l'adulte et l'enfant de plus de 30 mois.

Adultes : 10 gouttes après chaque selle liquide et espacer selon amélioration (maximum 60 gouttes par jour).

En cas d'absence d'amélioration dans les 48 heures, un avis médical est requis. Le traitement avec L107, solution buvable en gouttes pourra être poursuivi 3 jours après avis médical.

Enfant à partir de 30 mois sur avis médical uniquement :

3 gouttes après chaque selle liquide avec un intervalle d'au moins 4 heures entre 2 prises.

### **Mode d'administration**

A prendre dans un peu d'eau, de préférence en dehors des repas.

Gardez le médicament sous la langue avant de l'avaler.

Voie orale.



Tenir le flacon compte-gouttes verticalement.

### **Durée de traitement**

Le traitement ne devra pas dépasser 5 jours.

### **Si vous avez utilisé plus de L107, solution buvable en gouttes, que vous n'auriez dû :**

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

### **Si vous oubliez d'utiliser L107, solution buvable en gouttes :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)  
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

### **5. COMMENT CONSERVER L107, solution buvable en gouttes ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants. N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette et l'emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois. Tenir le flacon soigneusement fermé. Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

### **6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

#### **Ce que contient L107, solution buvable en gouttes ?**

##### **- Les substances actives sont :**

Arsenicum album	6 DH.....	3 ml
Belladonna	3 DH.....	3 ml
Chamomilla vulgaris	9 DH.....	3 ml
China rubra	3 DH.....	3 ml
Colocythis	4 DH.....	3 ml
Ipeca	4 DH.....	3 ml
Mercurius corrosivus	6 DH.....	3 ml
Nux vomica	4 DH.....	3 ml

pour 30 ml de solution buvable en gouttes.

##### **- Les autres composants sont :**

Eau purifiée, éthanol.

### **Aspect de L107, solution buvable en gouttes et contenu de l'emballage extérieur**

Solution buvable conditionnée en flacon de verre jaune de 30 ml avec compte-gouttes sous un étui cartonné.

### **La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est le 17/12/2015.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).



Les Laboratoires Lehning participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.