

**MEDICA COMPRIMÉS POUR LA GORGE MENTHOL, 5 mg/1 mg, comprimés à sucer**  
**Chlorhydrate de chlorhexidine - Chlorhydrate de lidocaïne**

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.



- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 à 4 jours.

**Que contient cette notice:**

1. Qu'est-ce que Medica comprimés pour la gorge menthol et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Medica comprimés pour la gorge menthol?
3. Comment utiliser Medica comprimés pour la gorge menthol?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Medica comprimés pour la gorge menthol?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1. QU'EST-CE QUE MEDICA COMPRIMÉS POUR LA GORGE MENTHOL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?**

Medica comprimés pour la gorge menthol est un comprimé à sucer pour une action locale dans la bouche et la gorge.

Il est un désinfectant et analgésique local.

Medica comprimés pour la gorge menthol est indiqué dans:

- Le traitement symptomatique du mal de gorge, de la gorge rouge, d'affections du pharynx accompagnées d'irritation;
- Un traitement complémentaire est nécessaire en cas d'infection bactérienne avec fièvre;
- Medica comprimés pour la gorge menthol ne contient pas de sucre et convient donc aussi aux diabétiques.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MEDICA COMPRIMES POUR LA GORGE MENTHOL?**

### **N'utilisez jamais Medica comprimés pour la gorge menthol**

- Si vous êtes allergique au chlorhydrate de chlorhexidine ou au chlorhydrate de lidocaïne ou à l'un des autres composants contenus dans Medica comprimés pour la gorge menthol mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez des enfants de moins de 6 ans.

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Medica comprimés pour la gorge menthol.

- Vous ne pouvez pas utiliser Medica comprimés pour la gorge menthol de façon prolongée, ininterrompue ou répétée. Limitez l'usage au strict nécessaire pour soulager la douleur et l'irritation.
- En cas de l'utilisation d'une trop forte dose (plus de 20 comprimés par jour), il y a un risque minime de diminution du contrôle du réflexe de déglutition.
- Chez les jeunes enfants qui ont déjà fait des convulsions. Ce médicament contient du menthol.
- Si vous utilisez d'autres médicaments. Veuillez également lire la rubrique «Autres médicaments et Medica comprimés pour la gorge menthol».

Veillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

### **Enfants**

N'utilisez pas ce médicament chez des enfants de moins de 6 ans.

### **Autres médicaments et Medica comprimés pour la gorge menthol**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez utilisé récemment ou pourriez utiliser tout autre médicament.

- Ne pas utiliser en même temps que des médicaments pour les formes légères d'Alzheimer (des inhibiteurs de cholinestérase).
- Ne pas utiliser en même temps que d'autres désinfectants.

### **Medica comprimés pour la gorge menthol avec des aliments et boissons**

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

### **Grossesse et allaitement**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de contracter une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Si vous respectez les précautions susmentionnées, vous pouvez utiliser Medica comprimés pour la gorge menthol pendant la grossesse et l'allaitement. Informez votre médecin de l'utilisation de ce médicament.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

### **Medica comprimés pour la gorge menthol contient du menthol et du sorbitol**

Medica comprimés pour la gorge menthol contient du menthol: soyez prudent chez les jeunes enfants qui ont déjà fait des convulsions.

Medica comprimés pour la gorge menthol contient du sorbitol. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament. Le sorbitol peut présenter un effet laxatif léger. La valeur calorique est 2,6 kcal/g sorbitol.

### **3. COMMENT UTILISER MEDICA COMPRIMÉS POUR LA GORGE MENTHOL?**

Veillez à toujours utiliser Medica comprimés pour la gorge menthol en suivant exactement les instructions de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est:

*Adultes:* 6 à 10 comprimés par jour.

*Enfants à partir de 6 ans:* 3 à 5 comprimés par jour.

Laisser fondre lentement le comprimé dans la bouche.

Ce médicament ne peut être utilisé pendant une période prolongée. Consultez un médecin si vos symptômes s'aggravent ou s'il n'y a pas d'amélioration après 3 à 4 jours.

#### **Si vous avez utilisé plus de Medica comprimés pour la gorge menthol que vous n'auriez dû**

Si vous avez utilisé trop de Medica comprimés pour la gorge menthol, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Ce médicament ne contient qu'une fraction de la dose toxique. En cas d'emploi correct, les risques de surdosage sont très minimes.

Les symptômes de surdosage sont: l'agitation, le bourdonnement d'oreilles, les difficultés respiratoires, la perturbation du rythme du cœur, diminution du contrôle du réflexe de déglutition.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?**

Comme tous les médicaments, Medica comprimés pour la gorge menthol peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Rarement: des réactions allergiques de la peau et des muqueuses.
- Des troubles de goût, une sensation de brûlure sur la langue et des réactions allergiques importantes (des réactions anaphylactiques) peuvent survenir.
- En cas d'usage prolongé sans interruption, une coloration brunâtre des dents peut apparaître. Cette coloration s'enlève cependant facilement.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable que ne serait pas mentionné dans cette notice.

**5. COMMENT CONSERVER MEDICA COMPRIMÉS POUR LA GORGE MENTHOL?**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. N'utilisez pas Medica comprimés pour la gorge menthol après la date de péremption indiquée sur la boîte/la plaquette thermoformée après « EXP ». Les deux premiers chiffres indiquent le mois, les deux ou quatre derniers l'année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

**6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS.**

**Ce que contient Medica comprimés pour la gorge menthol**

- Les substances actives sont: chlorhydrate de chlorhexidine 5 mg – chlorhydrate de lidocaïne 1 mg
- Les autres composants sont: sorbitol – stéarate de magnésium – acide citrique, anhydre – menthol.

**Aspect de Medica comprimés pour la gorge menthol est et contenu de l'emballage extérieur**

Medica comprimés pour la gorge menthol est disponible dans une boîte de 40 comprimés à sucer dans une plaquette thermoformée et dans une boîte de 36 comprimés à sucer dans une plaquette thermoformée pour délivrance à l'unité.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

**Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant**

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - Belgique

**Numéro d'autorisation de mise sur le marché:** BE172435

**Mode de délivrance**

Délivrance libre.

Egalement disponible dans la même gamme:

**MEDICA COMPRIMÉS POUR LA GORGE LEMON**, 5 mg/1 mg, comprimés à sucer:

Désinfectant et analgésique pour une action locale dans la bouche et la gorge

**MEDICA SPRAY POUR LA GORGE MENTHOL**, 20 mg/10 ml; 5 mg/10 ml, solution pour

pulvérisation buccale: Désinfectant et analgésique pour une action locale dans la bouche et la gorge

**MEDICA SPRAY POUR LA GORGE LEMON**, 20 mg/10 ml; 5 mg/10 ml, solution pour

pulvérisation buccale: Désinfectant et analgésique pour une action locale dans la bouche et la gorge

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 11/2012.**

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 11/2012**