

## **Neo-Saberyl, 0,8 g/100 ml, solution à diluer pour application cutanée**

Chlorophène

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.



- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

### **Que contient cette notice**

1. Qu'est-ce que Neo-Saberyl et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Neo-Saberyl?
3. Comment utiliser Neo-Saberyl?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Neo-Saberyl?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### **1. QU'EST-CE QUE NEO-SABENYL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE?**

Neo-Saberyl est indiqué dans:

- Le lavage des plaies souillées ou purulentes ou de la peau infectée par un champignon (mycose).
- Le nettoyage des lésions avec croûtes et des certains ulcères (ulcères variqueux).
- L'enlèvement des bouchons de cérumen et le nettoyage de l'eczéma infecté du conduit auditif.
- Désinfection du matériel sanitaire, récipients, linge, draps, langes, vaisselle, carrelage, murs, et cetera.
- Désinfection des instruments.
- Lavage des mains, préparation du champ opératoire et désinfection obstétricale (antisepsie obstétricale).

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER NEO-SABENYL?**

### **N'utilisez jamais Neo-Sabényl**

Si vous êtes allergique au chlorophène ou à l'un des autres composants contenus dans Neo-Sabényl mentionnés dans la rubrique 6.

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Neo-Sabényl.

- Utilisez Neo-Sabényl dilué dans de l'eau.
- Pour obtenir le meilleur effet désinfectant (antiseptique), il est recommandé de diluer Neo-Sabényl avec de l'eau douce ou de l'eau bouillie (15 minutes),
- Evitez tout contact avec les yeux.
- Evitez l'utilisation de Neo-Sabényl sur une grande surface de peau enflammée pendant un temps prolongé.
- Le sang et le pus diminuent l'activité de Neo-Sabényl.
- Si vous utilisez d'autres médicaments. Veuillez également lire la rubrique «Autres médicaments et Neo-Sabényl».

Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

### **Autres médicaments et Neo-Sabényl**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament. L'éther (un liquide volatil) diminue l'activité de Neo-Sabényl.

### **Neo-Sabényl avec des aliments et boissons**

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

### **Grossesse et allaitement**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de contracter une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

#### *Grossesse*

On évitera chez la femme enceinte d'appliquer Neo-Sabényl sur de grandes surfaces et pendant un temps prolongé.

#### *Allaitement*

On évitera chez la femme allaitante d'appliquer Neo-Sabényl sur de grandes surfaces et pendant un temps prolongé.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

**Neo-Sabényl ne contient pas d'exipients avec effet connu.**

### **3. COMMENT UTILISER NEO-SABENYL?**

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Neo-Sabenyl doit être dilué dans de l'eau avant d'être utilisé.

L'activité de Neo-Sabenyl n'est pas diminuée en présence de savon.

Usage externe.

#### La dose recommandée est:

- Le nettoyage des plaies, des lésions avec croûtes, des certains ulcères (ulcères variqueux), de la peau infectée par un champignon (mycose), de l'eczéma du conduit auditif et pour la désinfection obstétricale (antiseptie obstétricale): diluez 2 à 5 mesurettes par litre d'eau.
- Le lavage des mains, la préparation du champ opératoire et l'enlèvement des bouchons de cérumen: diluez 5 à 10 mesurettes par litre d'eau.
- La désinfection des récipients: diluez 2 à 4 mesurettes par litre d'eau.
- La désinfection des draps, linge, langes, vaisselle, carrelage, murs, et cetera.: diluez 5 à 10 mesurettes par 5 litres d'eau.
- La désinfection des instruments: diluez 10 à 20 mesurettes par litre d'eau.  
Si le chromage des instruments est abîmé, on ajoutera 20 g de benzoate de soude par litre de solution de Neo-Sabenyl prête à l'emploi.

#### **Si vous avez utilisé plus de Neo-Sabenyl que vous n'auriez dû**

Si vous avez utilisé ou pris trop de Neo-Sabenyl, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Si l'on avale accidentellement du Neo-Sabenyl, une intoxication peut se produire; elle pourra se manifester par un trouble de la vue (vision double ou diplopie), de la confusion, des convulsions, de la somnolence et des difficultés respiratoires.

Appelez immédiatement votre médecin, notamment pour prévenir toute atteinte rénale.

#### **Si vous oubliez d'utiliser Neo-Sabenyl**

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

#### **Si vous arrêtez d'utiliser Neo-Sabenyl**

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?**

Comme tous les médicaments, Neo-Sabényl peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants sont possibles:

- Irritation de la peau et des muqueuses.
- Eczéma allergique de contact.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

#### **5. COMMENT CONSERVER NEO-SABENYL?**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. Il n'y a pas de précautions particulières de conservation. N'utilisez pas Neo-Sabényl après la date de péremption indiquée sur l'emballage après «EXP». Les deux premiers chiffres indiquent le mois, les deux ou quatre chiffres suivants indiquent l'année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

#### **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS.**

##### **Ce que contient Neo-Sabényl**

- La substance active est chlorophène 0,8 g/100 ml.
- Les autres composants sont laurylsulfate de trolamine, édétate disodique, huile essentielle de lavande, alcool isopropylique, eau purifiée.

##### **Aspect de Neo-Sabényl et contenu de l'emballage extérieur**

Flacon de 200 ml et 1 l.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

##### **Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant**

Laboratoria QUALIPHAR N.V./ S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - Belgique

**Numéro d'autorisation de mise sur le marché:** BE048824 (200 ml et 1 l)

**Mode de délivrance:** Délivrance libre.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 01/2012.**

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 03/2012**