

Extrait sec de marron d'Inde

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 42 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Veinofytol gélules et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Veinofytol gélules ?
3. Comment prendre Veinofytol gélules ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Veinofytol gélules ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE VEINOFYTOLE GÉLULES ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Veinofytol est un médicament à base de plantes utilisé chez les adultes dans le traitement de l'insuffisance veineuse chronique, qui est caractérisée par des jambes gonflées, des varices, des sensations de lourdeur, douleur, fatigue, démangeaisons, tension et crampes dans les mollets.

L'emploi de ce médicament n'exclut pas la nécessité d'un examen médical.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE VEINOFYTOLE GÉLULES ?

Ne prenez jamais Veinofytol :

- si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Avvertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Veinofytol.

- Le traitement de l'insuffisance veineuse n'exclut pas les mesures classiques comme des exercices physiques et le contrôle du poids.
- En cas d'inflammation de la peau, de thrombophlébite, d'induration sous-cutanée, de douleur aiguë, d'ulcères, de gonflement soudain d'une ou des deux jambes, d'insuffisance cardiaque ou rénale, un médecin doit être consulté. Si les symptômes s'aggravent ou que des signes d'infections cutanées apparaissent lors de l'utilisation du médicament, un médecin ou un pharmacien doit être consulté.
- L'utilisation n'est pas recommandée chez les adolescents de moins de 18 ans en raison d'un manque de données de sécurité et d'efficacité.
- La prise à jeun provoque une sensation de nausée. Il est donc important de prendre les gélules en mangeant.

Enfants et adolescents

Il n'y a pas d'indication pertinente chez les enfants de moins de 12 ans. L'utilisation chez les adolescents de moins de 18 ans n'est pas recommandée.

Autres médicaments et Veinofytol

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Veinofytol avec des aliments et boissons

Non applicable.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Ne disposant pas de données suffisantes pour exclure tout effet néfaste durant la grossesse et l'allaitement, la prise de Veinofytol est déconseillée pendant ces périodes.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Non applicable.

3. COMMENT PRENDRE VEINOFYTOLE GÉLULES ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.



Tilman®

Chez l'adulte, la dose recommandée est de 1 gélule 2 fois par jour pendant le repas. Les gélules peuvent être prises pendant le repas du matin, du midi ou du soir.

Ne pas dépasser la dose maximale de 3 gélules par jour.

La gélule est à avaler avec un grand verre d'eau.

Au moins 4 semaines de traitement peuvent être requises avant d'observer un effet bénéfique.

En cas d'usage prolongé, le traitement doit être évalué périodiquement par un médecin.

Si vous avez pris plus de Veinofytol que vous n'auriez dû

Contactez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/245.245).

En cas de surdosage, un traitement symptomatique s'impose.

Si vous oubliez de prendre Veinofytol

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Veinofytol

Les troubles peuvent éventuellement réapparaître.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Des cas de troubles gastro-intestinaux, des maux de tête, des vertiges, des prurits ainsi que des réactions allergiques ont été signalés.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

- Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Division Vigilance : Avenue Galilée 5/03, 1210 BRUSSEL ou Boîte Postale 97, 1000 BRUXELLES Madou - Site internet : www.notifierunefetindesirable.be - E-mail : adr@afmps.be.
- Luxembourg : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy - crpv@chru-nancy.fr - Tél : (+33) 3 83 65 60 85 / 87 ou Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments à Luxembourg - pharmacovigilance@ms.etat.lu - Tél : (+352) 2478 5592.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER VEINOFYTOLE GÉLULES ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après la mention « EXP ». La date d'expiration fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver dans l'emballage d'origine.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation concernant la température.

Ne jetez aucun médicament au tout à l'égoût ni avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Veinofytol

La substance active est l'extrait sec de marron d'Inde.

Chaque gélule contient **192 - 258 mg d'extrait sec de *Aesculus hippocastanum* L., semen (marron d'Inde) correspondant à 21 mg d'hétérosides triterpéniques, exprimés en protoaescigénine.**

Solvant d'extraction : Ethanol 50 % V/V.

Les autres composants sont :

- Contenu de la gélule : cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, phosphate tricalcique, stéarate de magnésium, talc.
- Enveloppe de la gélule : gélatine, dioxyde de titane (E171), oxyde de fer rouge (E172), rouge allura AC (E129).
- Excipients utilisés dans l'extrait : maltodextrine, silice colloïdale anhydre.

Aspect de Veinofytol et contenu de l'emballage extérieur

Gélules opaques de teinte blanc/rouge foncé.

Veinofytol est disponible en boîtes de 40 ou 98 ou 100 x 1 gélules en plaquettes thermoformées PVC/PE/PVDC-aluminium.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, Belgique

Numéro de l'Autorisation de mise sur le marché :

BE278582

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : 10/2021

Paardekastanje droogextract

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen ? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan ? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 42 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger ? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Veinofytol harde capsules en waarvoor wordt dit middel gebruikt ?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn ?
3. Hoe neemt u dit middel in ?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel ?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

1. WAT IS VEINOFYTOLE HARDE CAPSULES EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT ?

Veinofytol is een geneesmiddel op basis van planten dat bij volwassenen wordt gebruikt bij de behandeling van chronische veneuze insufficiëntie, die gekenmerkt wordt door gezwollen benen, spataders, een gevoel van zwaarte, pijn, vermoeidheid, jeuk, spanning en krampen in de kuiten.

Het gebruik van dit geneesmiddel sluit de noodzaak van een medisch onderzoek niet uit. Het gebruik bij jongeren moet onder medisch toezicht gebeuren.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN ?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken ?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel ?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

- De behandeling van veneuze insufficiëntie sluit de klassieke maatregelen niet uit - zoals lichamelijke activiteit en controle van het gewicht.
- U moet een arts raadplegen bij ontsteking van de huid, tromboflebitis, onderhuidse verharding, acute pijn, zweren, plotsse zwelling van één of beide ledematen, hart- of nierinsufficiëntie. Raadpleeg uw arts of apotheker als de symptomen verergeren of als er tekenen van huidinfectie optreden tijdens het gebruik van het geneesmiddel.
- Het gebruik wordt niet aanbevolen bij adolescenten jonger dan 18 jaar vanwege een gebrek aan gegevens over veiligheid en werkzaamheid.
- Nuchtere innamen veroorzaken een misselijk gevoel. Het is bijgevolg belangrijk om de capsules bij de maaltijd in te nemen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Er zijn geen relevante indicaties bij kinderen onder de 12 jaar.

Gebruik bij adolescenten jonger dan 18 jaar wordt niet aanbevolen.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in ?

Neemt u naast Veinofytol nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen ? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken ?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om mogelijke nadelige effecten tijdens de zwangerschap of borstvoeding uit te sluiten. Het gebruik van Veinofytol wordt tijdens deze periodes niet aanbevolen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN ?

Neem dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.



De gebruikelijke dosering bij volwassenen is 1 capsule 2 maal per dag tijdens de maaltijden. De capsules mogen tijdens het ontbijt, de middag of avondmaaltijd worden ingenomen.

Overschrijdt de maximale dosis van 3 capsules per dag niet. De capsule moet worden ingeslikt met een groot glas water.

Er zijn minstens 4 weken behandeling nodig voordat u enig gunstig effect waarneemt.

Bij langdurig gebruik moet de behandeling periodiek worden geëvalueerd door een arts.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen ?

Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antifictiecentrum (070/245.245).

Bij overdosering moet een symptomatische behandeling worden ingesteld.

Bent u vergeten dit middel in te nemen ?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

De oorspronkelijke symptomen kunnen opnieuw verschijnen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Er werden gevallen van gastro-intestinale stoornissen, hoofdpijn, duizeligheid, jeuk en allergische reacties gemeld.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via :

- Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Afdeling Vigilantie : Galileelaan 5/03, 1210 BRUSSEL of Postbus 97, 1000 BRUSSEL Madou - Website : www.eenbijwerkingmelden.be - E-mail : adr@fagg.be.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.



Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in : 10/2021

DE

Veinofytol®

Hartkapselen

Roskastaniensamen-Trockenextract

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen. Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich 42 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Veinofytol magensaftresistente Tabletten und wofür wird es angewendet ?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Veinofytol magensaftresistente Tabletten beachten ?
3. Wie ist Veinofytol magensaftresistente Tabletten einzunehmen ?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich ?
5. Wie ist Veinofytol magensaftresistente Tabletten aufzubewahren ?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

1. WAS IST VEINOFYTOLO HARTKAPSELN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET ?

Veinofytol ist ein Arzneimittel auf pflanzlicher Basis, das bei chronische venöse Unzulänglichkeit angewendet wird. Dieses Arzneimittel wird bei Erwachsenen zur Behandlung einer chronischen venösen Unzulänglichkeit verwendet, die sich durch geschwellene Beine, Krampfadern, Schweregefühl, Schmerzen, Ermüdung, Juckreiz, Spannungsgefühle und Wadenkrämpfe äußert.

Die Einnahme dieses Arzneimittels schließt die Notwendigkeit einer medizinischen Untersuchung nicht aus.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON VEINOFYTOLO HARTKAPSELN BEACHTEN ?

Veinofytol darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Veinofytol einnehmen.

- Die Behandlung der venösen Unzulänglichkeit schließt klassische Maßnahmen, wie sportliche Übungen und eine Gewichtsreduzierung, nicht aus.
- Bei einer Hautentzündung, einer Venenentzündung, einer subkutanen Verhärtung, stechenden Schmerzen, Ulzera, plötzlichem Anschwellen eines oder beider Beine, einer Herzunzulänglichkeit oder einer renalen Unzulänglichkeit ist ein Arzt hinzuzuziehen. Wenn sich die Symptome verschlechtern oder Anzeichen von Hautinfektionen während der Anwendung des Arzneimittels auftreten, sollte sie ein Arzt oder Apotheker konsultieren.
- Die Anwendung wird bei Jugendlichen unter 18 Jahren aufgrund fehlender Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten nicht empfohlen.
- Eine Einnahme auf nüchternen Magen verursacht Übelkeit. Daher müssen die Kapseln beim Essen eingenommen werden.

Kinder und Jugendliche

Bei Kindern unter 12 Jahren gibt es keine relevante Indikation. Die Anwendung bei Jugendlichen unter 18 Jahren wird nicht empfohlen.

Einnahme von Veinofytol zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Einnahme von Veinofytol zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Nicht zutreffend.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es stehen nicht genügend Daten zur Verfügung, um eventuelle verhängnisvolle Auswirkungen während der Schwangerschaft oder Stillzeit auszuschließen. Die Anwendung von Veinofytol während der Schwangerschaft oder Stillzeit wird nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Nicht zutreffend.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL ?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum.

Die is te vinden op de doos na « EXP ». Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel ?

De werkzame stof in dit middel is paardekastanje droogextract.

Iedere tablet bevat **192 - 258 mg droogextract van *Aesculus hippocastanum* L., semen (paardekastanje) wat overeenkomt met een hoeveelheid van 21 mg triterpeenglycosiden, uitgedrukt in protoaescigenine**. Oplosmiddel : Ethanol 50 % V/V.

De andere stoffen in dit middel zijn :

- Capsule-inhoud : microkristallijne cellulose, colloïdaal anhydrijsilicium, tricalciumfosfaat, magnesiumstearaat, talk.
- Capsulewand : gelatine, titaandioxide (E171), rood ijzeroxide (E172), allura AC rood (E129).
- Hulpstoffen in het extract : maltodextrine, colloïdaal anhydrijsilicium.

Hoe ziet Veinofytol eruit en hoeveel zit er in een verpakking ?

Ondoorschijnende, wit/donkerrood kleurige capsules. Veinofytol is beschikbaar in PVC/PE/PVDC-aluminium blisterverpakkingen met 40 of 98 of 100 x 1 capsules per verpakking.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Tilman n.v., Z.I. Sud 15, 5377 Bailionville, België

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen :

BE278582

Afleveringswijze

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

3. WIE IST VEINOFYTOLO HARTKAPSELN EINZUNEHMEN ?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis bei Erwachsenen beträgt 1 Kapsel 2 mal täglich zu den Mahlzeiten. Die Kapseln können zu den Mahlzeiten morgens, mittags oder abends eingenommen werden.

Die maximale Dosis (3 Kapseln täglich) darf nicht überschritten werden.

Die Kapsel ist mit einem großen Glas Wasser einzunehmen. Eine Besserung zeigt sich erst nach einer wenigstens 4-wöchigen Behandlung.

Bei einer längeren Anwendung muss in regelmäßigen Abständen ein Arzt konsultiert werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Veinofytol eingenommen haben, als Sie sollten

Kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt oder Apotheker oder die Giftnotrufzentrale (070/245.245).

Bei Überdosierung ist eine symptomatische Behandlung erforderlich.

Wenn Sie die Einnahme von Veinofytol vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Veinofytol abbrechen

Erneutes Auftreten der Beschwerden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH ?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es sind einige Fälle von Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen, Schwindelgefühlen, Juckreiz und allergischen Reaktionen dokumentiert.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über :

- Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte. Abteilung Vigilanz : Avenue Galilée - Galileelaan 5/03, 1210 BRUSSEL oder Postfach 97, 1000 BRUSSEL Madou - Website : www.notifieruffetindexirabile.be - E-Mail : adr@fagg-afmps.be.
- Luxemburg : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy - crpv@chru-nancy.fr - Tel. : (+33) 383 65 60 85 / 87 oder Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments à Luxembourg - pharmacovigilance@ms.etat.lu - Tel. : (+352) 2478 5592.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST VEINOFYTOLO HARTKAPSELN AUFZUBEWAHREN ?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach « EXP » angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

In der Originalverpackung aufbewahren.

Für dieses Arzneimittel sind bezüglich der Temperatur keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER VERPAKKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Veinofytol enthält

Der Wirkstoff ist Roskastaniensamen-Trockenextrakt. Jede Tablette enthält **192 - 258 mg Trockenextrakt aus *Aesculus hippocastanum* L., semen (Roskastaniensamen), entspricht einer Gesamtmenge an Saponosiden von 21 mg Triterpeenglykoside, berechnet als Protoaescigenin**. Auszugsmittel : Ethanol 50 % V/V.

Die sonstigen Bestandteile sind :

- Kapselinhalt : mikrokristalline Cellulose, wasserfreie kolloidale Kieselerde, Tricalciumphosphat, Magnesiumstearat, Talk.
- Kapselhüllen : Gelatine, Titandioxid (E171), Eisenoxid rot (E172), Allurarot AC (E129).
- Hilfsstoffen des Extrakts : Maltodextrin, wasserfreie kolloidale Kieselerde.

Wie Veinofytol aussieht und Inhalt der Packung

Undurchsichtige, weiss und dunkelrotfarbene Hartkapseln. Veinofytol ist in PVC/PE/PVDC-Aluminium-Bliesterpackungen in Packungsgrößen mit je 40 oder 98 Kapseln oder 100 x 1 Kapsel pro Faltschachtel erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Bailionville, Belgien

Zulassungsnummer : BE278582

Abgabe: Nicht verschreibungspflichtig.



Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im : 10/2021