

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

### ECHINACIN LIQUIDUM, solution buvable

*Echinacea purpurea* (L) Moench

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 14 jours.

#### **Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce qu' Echinacin Liquidum et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Echinacin Liquidum
3. Comment prendre Echinacin Liquidum
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Echinacin Liquidum
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### **1. QU'EST-CE QUE ECHINACIN LIQUIDUM ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE**

Echinacin Liquidum est utilisé dans le traitement symptomatique des infections des voies respiratoires supérieures, après que toute maladie sévère ait été écartée.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 14 jours.

#### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ECHINACIN LIQUIDUM**

##### **Ne prenez jamais Echinacin Liquidum**

- si vous êtes allergique à l'Echinacea purpurea ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes allergique à d'autres plantes appartenant à la famille des Astéracées (Composées).
- si vous avez une maladie évolutive telle que tuberculose, augmentation anormale du nombre de globules blancs dans le sang, maladie du tissu de soutien, sclérose en plaque, sida et infection apparentées et maladies auto-immunes.

##### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Echinacin Liquidum.

Vous devez informer votre médecin ou votre pharmacien dans les cas suivants :

- si vous souffrez de maladies liées à une atteinte immunologique, de maladies auto-immunes.

Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique « Autres médicaments et Echinacin Liquidum ».

Pas d'utilisation prolongée sans avis médical.

Enfants et adolescents :

L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée chez les enfants de moins de 2 ans.

#### **Autres médicaments et Echinacin Liquidum**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Etant donné l'absence d'information quant à une éventuelle interaction avec un traitement de désensibilisation allergique, il est recommandé de ne pas utiliser l'Echinacin Liquidum au cours d'un tel traitement.

Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'une préparation alcoolique, un effet DISULFIRAM peut apparaître lors de l'association avec certains médicaments.

#### **Echinacin Liquidum avec des aliments, des boissons et de l'alcool**

L'alcoolisme constitue une contre-indication relative.

#### **Grossesse, allaitement et fertilité**

Vu le nombre limité de données, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament durant la grossesse et l'allaitement, sauf avis contraire de votre médecin.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de contracter une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

#### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Aux doses prescrites, la quantité d'alcool absorbée n'influence normalement pas la capacité de conduite ou d'utilisation de machines.

Il faut tenir compte du fait que le flacon contient une quantité d'alcool pouvant avoir une influence néfaste lors de l'utilisation de machines et de la conduite de véhicules, si tout le contenu du flacon est bu en une fois.

**Echinacin Liquidum contient environ 22% de vol d'éthanol (alcool)**, c-à-d. 550 mg d'éthanol par dose de 2,5 ml pour les adultes, équivalent à 12 ml de bière ou 4,6 ml de vin et 275 mg d'éthanol par 1,25 ml, dose pour les enfants, équivalente à 6 ml de bière ou 2,3 ml de vin.

Nocif pour ceux qui souffrent d'alcoolisme.

A prendre en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les patients atteints d'une maladie du foie ou d'épilepsie.

### **3. COMMENT PRENDRE ECHINACIN LIQUIDUM**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Si aucune amélioration n'apparaît, veuillez consulter à nouveau votre médecin.

La dose recommandée est de :

**Adultes**

- Le premier jour: la première dose est de 2,5 ml. Ensuite et pour le reste de la journée, la dose est de 1,25 ml toutes les 2 heures.
  - A partir du deuxième jour, la dose est de 2,5 ml , 3 fois par jour.
- La dose maximale est de 15 ml par jour.

**Utilisation chez les enfants**

Enfants de 2 à 12 ans:

1 goutte par kilo de poids de l'enfant par jour, en 3 prises par jour.

Enfants de moins de 2 ans:

L'utilisation chez les enfants de moins de 2 ans n'est pas recommandée (Voir rubrique 2 avertissements et précautions).

L'Echinacin Liquidum doit être dilué dans un peu de liquide.

Un traitement de longue durée n'apporte pas de bénéfice supplémentaire. La durée maximale de traitement sans interruption est de deux semaines.

Votre médecin vous dira combien de temps vous devrez utiliser Echinacin Liquidum. N'arrêtez pas prématurément votre traitement.

**Si vous avez pris plus de Echinacin Liquidum que vous n'auriez dû**

Si vous avez utilisé ou pris trop d' Echinacin Liquidum, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/245.245).

Aucun cas d'intoxication par surdosage n'a été signalé à ce jour.

En cas de surdosage, la prise du médicament sera interrompue.

**Si vous oubliez de prendre Echinacin Liquidum**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

**Si vous arrêtez de prendre Echinacin Liquidum**

Aucun effet n'apparaît.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Les effets indésirables suivants ont été rapportés :**

Des cas d'hypersensibilité grave ont été rapportés, tels que: cloques sur les membranes cutanées et muqueuses (syndrome de Stevens-Johnson), gonflement de la peau dû à une accumulation de liquide (œdème de Quincke), gonflement de la peau (angio oedème), choc anaphylactique et difficultés respiratoires ( bronchospasme avec obstruction) hypotension. Si de tels symptômes surviennent, arrêtez de prendre Echinacea et consultez immédiatement un médecin.

L'échinacée peut déclencher des réactions allergiques chez les patients à tendance allergique. Les effets indésirables suivants ont été observés, alors que la fréquence de ces effets indésirables est inconnue: asthme, gonflement de la peau (angio œdème), éruption cutanée, prurit, urticaire, nausée, vomissement, diarrhée, douleur abdominale.

Des affections en relation avec le système immunitaire ne peuvent pas être exclues.

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement.

En Belgique : via

l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

Division Vigilance

EUROSTATION II

Place Victor Horta, 40/40

B-1060 Bruxelles

Site internet: [www.afmps.be](http://www.afmps.be).

Adresse e-mail : [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be).

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5 COMMENT CONSERVER ECHINACIN LIQUIDUM ?**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver le flacon soigneusement fermé, à l'abri de la lumière et à température ambiante, entre +15°C et +25°C

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette, l'emballage, le flacon après la mention « EXP. ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

### **Ce que contient Echinacin Liquidum :**

- La substance active est le suc exprimé de l'herbe d'*Echinacea purpurea* (L) Moench
- L'autre composant (excipient) est : l'alcool 96%V/V

### **Aspect d'Echinacin Liquidum et contenu de l'emballage extérieur**

Flacon de verre contenant 50 ou 100 ml de solution buvable.

### **Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant**

*Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché :*

Mylan EPD bvba/sprl

Terhulpesteenweg, 6A

B-1560 Hoeilaart

Notice

*Fabricant:*

Madaus GmbH; D-51101 Cologne, Allemagne

**Numéro d'autorisation de mise sur le marché**

BE211233

**Mode de délivrance**

Délivrance libre

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 07/2019.**