

Module 1.3.1.3 - FR	NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR
MELISANA S.A. Av. du Four à Briques 1 B-1140 Bruxelles	<b>Siroxyl sans sucre 250 mg/5 ml sirop</b>
Grouping – Type II variation clinical: PSUR & posology ID 281182- ID 281184	Page 1 / 5

## Notice : information de l'utilisateur

### Siroxyl sans sucre 250 mg/5 ml solution buvable

Carbocistéine

**Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 jours.

#### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Siroxyl sans sucre 250 mg/5 ml solution buvable et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Siroxyl sans sucre 250 mg/5 ml solution buvable
3. Comment utiliser Siroxyl sans sucre 250 mg/5 ml solution buvable
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Siroxyl sans sucre 250 mg/5 ml solution buvable
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. Qu'est-ce que Siroxyl sans sucre 250 mg/5 ml solution buvable et dans quel cas est-il utilisé ?

La carbocistéine est utilisée pour son action fluidifiante sur les mucosités en cas d'affections des voies respiratoires accompagnées de toux.

#### 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Siroxyl sans sucre 250 mg/5 ml solution buvable ?

##### N'utilisez jamais Siroxyl sans sucre

- Si vous êtes allergique à la carbocistéine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- Si vous avez un ulcère actif de l'estomac (ulcère gastro-duodéal).
- Si vous souffrez de phénylcétonurie (maladie métabolique héréditaire et congénitale).
- Ne pas utiliser Siroxyl sans sucre chez les enfants âgés de moins de 2 ans.

##### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Si la prise de Siroxyl sans sucre n'améliore pas les symptômes, demandez un avis médical.

La prudence s'impose si vous êtes une personne âgée, si vous avez déjà eu des ulcères dans le tractus gastro-intestinal ou si vous prenez simultanément des médicaments connus pour leur potentiel à provoquer des hémorragies dans le tractus gastro-intestinal, ou encore si vous utilisez ce médicament pendant une longue période. Arrêtez de prendre ce médicament si de telles hémorragies se produisent.

Module 1.3.1.3 - FR	NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR
MELISANA S.A. Av. du Four à Briques 1 B-1140 Bruxelles	<b>Siroxyl sans sucre 250 mg/5 ml sirop</b>
Grouping – Type II variation clinical: PSUR & posology	Page 2 / 5

Siroxyl sans sucre ne contient ni saccharose, ni glucose.

### **Autres médicaments et Siroxyl sans sucre**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Siroxyl sans sucre peut être associé à un traitement antibiotique.

### **Siroxyl sans sucre avec des aliments, boissons et de l'alcool**

Sans objet.

### **Grossesse, allaitement et fertilité**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

L'administration de Siroxyl sans sucre est déconseillée pendant la période de grossesse et d'allaitement.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

### **Siroxyl sans sucre contient du parahydroxybenzoate de méthyle**

Peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

**Siroxyl sans sucre contient environ 130 mg de sodium** (composant principal du sel de cuisine/table) par 5 ml. Cela équivaut à 6,5 % de l'apport alimentaire quotidien maximal recommandé de sodium pour un adulte.

### **3. Comment utiliser Siroxyl sans sucre 250 mg/5 ml solution buvable ?**

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est :

- Ne pas dépasser les quantités indiquées :
  - \* de 2 à 5 ans : 5 ml 2 fois par jour, soit 500 mg de carbocistéine par jour.
  - \* de 5 à 12 ans : 7,5 ml 2 fois par jour, soit 750 mg de carbocistéine par jour.
  - \* de 12 à 15 ans : 15 ml 2 fois par jour, soit 1500 mg de carbocistéine par jour.
  - \* Adultes (à partir de 15 ans) : 30 ml 2 fois par jour, soit 3 g de carbocistéine par jour.

Le médicament est fourni avec un godet gradué à 5 ml / 7,5 ml et 15 ml.

Ne pas administrer aux enfants âgés de moins de 2 ans.

N.B. : La forme Siroxyl enfants est mieux adaptée pour les enfants.

Le traitement doit être pris en moyenne pendant une quinzaine de jours. Certaines affections chroniques nécessitent un traitement de 3 à 4 semaines.

### Mode et voie d'administration

Administration orale.

Le traitement par Siroxyl sans sucre doit être réévalué par votre médecin traitant en l'absence d'amélioration après 3 jours consécutifs de traitement.

**Si vous avez pris plus de Siroxyl sans sucre que vous n'auriez dû**

Module 1.3.1.3 - FR	NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR
MELISANA S.A. Av. du Four à Briques 1 B-1140 Bruxelles	<b>Siroxyl sans sucre 250 mg/5 ml sirop</b>
Grouping – Type II variation clinical: PSUR & posology	Page 3 / 5

Si vous avez pris trop de Siroxyl sans sucre, contactez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons **(070/245.245)**.

Les signes d'un surdosage sont des troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements). En cas de suspicion de surdosage, une aide médicale doit être demandée avant tout.  
En principe, une admission à l'hôpital n'est pas nécessaire.

#### **Si vous oubliez de prendre Siroxyl sans sucre**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

#### **Si vous arrêtez d'utiliser Siroxyl sans sucre**

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

#### **Arrêtez l'utilisation de Siroxyl sans sucre et prenez contact avec votre médecin ou rendez-vous directement à l'hôpital si vous présentez les symptômes suivants (fréquence indéterminée) :**

- Vous développez une réaction allergique. Les signes peuvent être les suivants : éruption cutanée (avec ou sans formation de cloques), problèmes pour avaler ou pour respirer, gonflement des lèvres, du visage, de la gorge ou de la langue.

#### **Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous présentez l'un des effets indésirables suivants :**

- Fréquents (peuvent se produire chez moins de 1 patient sur 10) : maux d'estomac, nausées, vomissements et diarrhée. Le cas échéant, il est conseillé de diminuer la quantité. Ces effets indésirables ont été rapportés à une fréquence de 1,13 % pour le médicament et à une fréquence de 4,26 % pour le placebo.
- Rares (peuvent se produire chez moins de 1 patient sur 1 000) : maux de tête ; le cas échéant, il est conseillé de diminuer la dose.
- Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) : hémorragies dans le tractus gastro-intestinal, réactions cutanées incluant de petites vésicules rouges sur la peau, une plaque surélevée et clairement délimitée, accompagnée de rougeurs et, parfois, de cloques, apparaissant toujours au même endroit. Dans ces cas, arrêtez immédiatement l'administration.

#### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

- **Belgique**  
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé  
Division Vigilance  
Boîte postale 97  
B-1000 Bruxelles Madou  
Site internet : [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be)  
E-mail : [adr@afmps.be](mailto:adr@afmps.be)

Module 1.3.1.3 - FR	NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR
MELISANA S.A. Av. du Four à Briques 1 B-1140 Bruxelles	<b>Siroxyl sans sucre 250 mg/5 ml sirop</b>
Grouping – Type II variation clinical: PSUR & posology	Page 4 / 5

- **Luxemburg**

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy

[crpv@chru-nancy.fr](mailto:crpv@chru-nancy.fr)

Tél. : (+33) 3 83 65 60 85 / 87

Fax : (+33) 3 83 65 61 33

ou

Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé à Luxembourg

[pharmacovigilance@ms.etat.lu](mailto:pharmacovigilance@ms.etat.lu)

Tél. : (+352) 247-85592

Fax : (+352) 247-95615

Lien pour le formulaire : <http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.html>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. Comment conserver Siroxyl sans sucre 250 mg/5 ml solution buvable ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver à une température ne dépassant pas 25°C, à l'abri de la lumière.

Ne pas conserver au réfrigérateur.

N'utilisez pas Siroxyl sans sucre après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. Contenu de l'emballage et autres informations

### Ce que contient Siroxyl sans sucre

La substance active est la carbocistéine.

Les autres composants sont : parahydroxybenzoate de méthyle – saccharine sodique – hydroxyéthylcellulose – composition aromatique 21P087 – hydroxyde de sodium – eau purifiée.

Voir aussi rubrique 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Siroxyl sans sucre 250 mg/5 ml solution buvable ? « Siroxyl sans sucre contient... ».

### Aspect de Siroxyl sans sucre et contenu de l'emballage extérieur

Siroxyl sans sucre est commercialisé sous la présentation suivante : flacon de 125 ml et 300 ml, accompagné d'un godet gradué.

### Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

#### Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

Pour tout complément d'information sur ce médicament, prenez contact avec le titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché :

MELISANA S.A.

Av. du Four à Briques 1

B-1140 Bruxelles

Module 1.3.1.3 - FR	NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR
MELISANA S.A. Av. du Four à Briques 1 B-1140 Bruxelles	<b>Siroxyl sans sucre 250 mg/5 ml sirop</b>
Grouping – Type II variation clinical: PSUR & posology	Page 5 / 5

Fabricant de Siroxyl sans sucre 250 mg/5 ml solution buvable

H2 PHARMA  
ZA La Croix Bonnet  
21 rue Jacques Tati  
F-78390 Bois-d'Arcy  
France

**Numéro d'Autorisation de mise sur le marché**

*Siroxyl sans sucre 250 mg/5 ml solution buvable* : BE239872

**Mode de délivrance**

Délivrance libre.

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 06/2021.**