

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

### Dénomination du médicament

**EOSINE AQUEUSE GILBERT 2 %, Solution pour Application Cutanée**  
{Eosine disodique}

### Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que EOSINE AQUEUSE GILBERT 2 %, Solution pour Application Cutanée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser EOSINE AQUEUSE GILBERT 2 %, Solution pour Application Cutanée?
3. Comment utiliser EOSINE AQUEUSE GILBERT 2 %, Solution pour Application Cutanée?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver EOSINE AQUEUSE GILBERT 2 %, Solution pour Application Cutanée?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE QUE EOSINE AQUEUSE GILBERT 2 %, SOLUTION POUR APPLICATION CUTANÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous la forme d'une solution pour application cutanée en flacon unidose en polyéthylène de 5 ml ou 2 ml, boîte de 10.

Il est utilisé dans le traitement d'appoint des affections cutanées et des muqueuses infectées et/ou suintantes.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER EOSINE AQUEUSE GILBERT 2 %, SOLUTION POUR APPLICATION CUTANÉE?

**N'utilisez jamais EOSINE AQUEUSE GILBERT 2 %, Solution pour Application Cutanée:**

- si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser EOSINE AQUEUSE GILBERT 2 %, Solution pour Application Cutanée.

Tout flacon entamé doit être utilisé dans les 48 heures pour éviter toute contamination microbienne.

Ne pas utiliser de façon prolongée sur des surfaces étendues.

Ne pas mettre en contact avec les yeux.

Ne pas avaler.

Le produit provoque des taches sur les vêtements

### Enfants

Sans objet.

**Autres médicaments et EOSINE AQUEUSE GILBERT 2 %, Solution pour Application Cutanée**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament, , même s'il s'agit de médicaments obtenus sans ordonnance.

Compte – tenu des interférences possibles, l'emploi simultané ou successif avec d'autres solutions à application cutanée (agents oxydants ou acides) est à éviter.

L'usage successif avec d'autres antiseptiques est déconseillé.

### **EOSINE AQUEUSE GILBERT 2 %, Solution pour Application Cutanée avec des aliments et boissons**

Sans objet.

#### **Grossesse et allaitement**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Allaitement :

Vu son absence de toxicité, l'éosine aqueuse peut être employée sans restriction en période d'allaitement, du moins en solution aqueuse. Ne pas mettre l'éosine aqueuse sur les mamelons en période d'allaitement.

#### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

### **3. COMMENT UTILISER EOSINE AQUEUSE GILBERT 2 %, SOLUTION POUR APPLICATION CUTANÉE?**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La dose habituelle est de une à deux fois par jour, à appliquer localement à l'aide d'une compresse stérile ou verser directement sur l'endroit à traiter.

Usage externe exclusivement.

#### **Si vous avez utilisé plus de EOSINE AQUEUSE GILBERT 2 %, Solution pour Application Cutanée que vous n'auriez dû :**

Si vous avez pris trop d'Eosine aqueuse Gilbert 2%, Solution pour application cutanée, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245.245).

#### **Si vous oubliez d'utiliser EOSINE AQUEUSE GILBERT 2 %, Solution pour Application Cutanée:**

Sans objet.

#### **Si vous arrêtez d'utiliser EOSINE AQUEUSE GILBERT 2 %, Solution pour Application Cutanée:**

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Risque de photosensibilisation et d'éruptions cutanées localisées,

#### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Site internet:[www.afmps.be](http://www.afmps.be), e-mail: [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be)

**En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament**

## **5. COMMENT CONSERVER EOSINE AQUEUSE GILBERT 2 %, SOLUTION POUR APPLICATION CUTANÉE?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après {EXP}. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Un flacon entamé doit être utilisé dans les 48 heures après ouverture.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez que la solution est décolorée.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

### **Ce que contient EOSINE AQUEUSE GILBERT 2 %, Solution pour Application Cutanée**

- La substance active est :  
Eosine disodique 2.00 g
- L'autre composant est : Eau purifiée

### **Qu'est-ce que EOSINE AQUEUSE GILBERT 2 %, Solution pour Application Cutanée et contenu de l'emballage extérieur**

EOSINE AQUEUSE GILBERT 2 %, Solution pour Application Cutanée est une solution aqueuse d'éosine contenue dans un flacon unidose de 5 ml ou 2 ml, en polyéthylène.

### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant**

**Laboratoires GILBERT**  
928 Avenue du Général de Gaulle  
14200 Hérouville Saint-Clair  
FRANCE

### **Mode de délivrance**

Médicament non soumis à prescription médicale.

### **Numéro (s) d'autorisation de mise sur le marché**

N° : BE151505 (5 ml boîte de 10)

N° : BE151505 (2 ml boîte de 10)

### **La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

Date de l'approbation : 08/2016