

Verbraucherinformation:

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

**GEBRAUCHSINFORMATION
CHLORAETHYL DR. HENNING®**

INN: Chlorethan

Zusammensetzung

Wirksamer Bestandteil:

100 ml Lösung enthalten: Chlorethan 100 ml - Ohne Treibgas

Darreichungsform und Inhalt

Sprühflaschen (Glas) zu 100 ml Lösung Spraydosen zu 100 bzw. 175 ml Lösung

Anwendungsgebiete

Zur lokalen Kälteanästhesie (Vereisung). Sportverletzungen (Zerrungen, Prellungen, Verstau- chungen), kleine chirurgische Eingriffe, Piercing, Chiropody (Fußpflege-Pediküre), Muskelkrämpfe, Kältetherapie bei Schwellungen, Muskelschmerzen, Sehnenscheidenreizungen (Tennisarm), Beschwerden der Gelenkbänder.

Lokalanästhetikum**Gegenanzeigen**

Wann dürfen Sie Chloraethyl "Dr. Henning" nicht anwenden?

Bei Allergie gegen Chlorethan. Chlorethan darf nicht auf verletzte Hautstellen und Schleimhäute gesprüht werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Nicht für Vollnarkose. Nicht bei offener Flamme verwenden. Vorsicht bei Anwendung im Kopf-Hals-Bereich, um die Einatmung von Chlorethan zu vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung.

Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit mit Maschinen und bei Arbeiten ohne sicheren Halt beachten?

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist nicht mit Auswirkungen auf Kraftfahrer und das Bedienen von Maschinen zu rechnen. Wird Chlorethan eingeatmet, so kann das Reaktionsvermögen so weit verändert werden, daß die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Sie können dann auf unerwartete und plötzliche Ereignisse nicht mehr schnell und gezielt genug reagieren. Fahren Sie nicht Auto oder andere Fahrzeuge! Bedienen Sie keine elektrischen Werkzeuge oder Maschinen! Arbeiten Sie nicht ohne sicheren Halt! Beachten Sie besonders, daß Alkohol Ihre Verkehrstüchtigkeit noch weiter verschlechtert!

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Chloraethyl "Dr. Henning" nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Chloraethyl "Dr. Henning" sonst nicht richtig wirken kann!

Wie und wann sollten Sie Chloraethyl "Dr. Henning" anwenden?

Die behandlungsbedürftigen Körperstellen aus ca. 30 cm Entfernung kurzfristig besprühen (einige Sekunden).

Wie lange sollten Sie Chloraethyl „Dr. Henning“ anwenden?

Das Kältespray längstens bis zur Bildung eines dünnen Schneefilms anwenden.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Was ist zu tun wenn Chloraethyl „Dr. Henning“ in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Bei Überdosierung von Chlorethan kann es zu Erfrierungen der Haut kommen. Anzeichen einer Intoxikation durch Einatmen von Chlorethan sind Pränarkose-Katersyndrom, Rauschzustände, Bewußtlosigkeit und zentrale Atem- und Kreislaufähmung. Gegenmaßnahmen sind neben Standardmaßnahmen bei Vergiftungen die Förderung der pulmonalen Giftausscheidung durch forcierte Abatmung sowie die prophylaktische Gabe von Xylocain (Kammerflimmern). Keinesfalls Sympathomimetika geben, Gefahr von Herzkammerflimmern! Kein Alkohol, Milch oder Rizinus.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Chloraethyl „Dr. Henning“ auftreten?

Allergische Hautveränderungen. Bei sachgerechter Anwendung von Chlorethan sind ansonsten bisher keine Nebenwirkungen bekannt. Wird Chlorethan zu lange aufgesprüht, kann es zu Erfrierungsscheinungen an der Haut kommen. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Medizinproduktes

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der äußeren Umhüllung und dem Behältnis aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist Chloraethyl „Dr. Henning“ aufzubewahren?

Vor Licht geschützt aufzubewahren. Nicht im Kühlschrank lagern.

MEDIZINPRODUKT, FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN!

Sprühflasche nach Gebrauch wieder sorgfältig verschließen!

Behältnis nur völlig entleert entsorgen!