

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Strepsils Vit C Orange, pastilles

Alcool dichlorobenzyle, amylmétacrésol et vitamine C

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 à 4 jours.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que Strepsils Vit C Orange et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Strepsils Vit C Orange ?
3. Comment utiliser Strepsils Vit C Orange ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Strepsils Vit C Orange ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Strepsils Vit C Orange et dans quel cas est-il utilisé ?

- Strepsils sont des pastilles désinfectantes qui se dissolvent lentement dans la bouche. Sont également disponibles : Strepsils Sans Sucre Fraise, Strepsils Miel & Citron, Strepsils Sans Sucre Citron et Strepsils Cool Mint, pastilles.
Strepsils + Lidocaïne est disponible en pastilles de même qu'en spray pour la gorge.
- Strepsils peut être utilisé pour le soulagement des symptômes des maux de gorge aigus. Strepsils peut aussi être utilisé comme traitement complémentaire local des angines, des inflammations des amygdales et de la muqueuse buccale (inflammation des gencives, aphtes).

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 à 4 jours.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Strepsils Vit C Orange ?

N'utilisez jamais Strepsils :

- chez les enfants de moins de 5 ans.
- si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

- Tout mal de gorge persistant plus de 3 à 4 jours et/ou accompagné de fièvre nécessite l'avis de votre médecin.

- Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique « Autres médicaments et Strepsils »
- Ce médicament ne convient pas pour les jeunes enfants en raison du risque d'étouffement.

Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

Autres médicaments et Strepsils

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Il n'y a aucune interaction entre Strepsils et les antibiotiques; leur utilisation concomitante est donc possible.

Grossesse, allaitement et fertilité

Il n'y a pas ou peu de données disponibles sur l'utilisation de ce médicament au cours de ces périodes. Ainsi Strepsils n'est pas recommandé pour utilisation pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de contracter une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vu les caractéristiques du produit, il est improbable que Strepsils ait la moindre influence sur la conduite de véhicules et l'utilisation de machines.

Strepsils contient ponceau 4R, jaune orangé S, glucose et saccharose

Strepsils Vit C contient du ponceau 4R (E124) et du jaune orangé S (E110) et peut provoquer des réactions allergiques.

Ce médicament contient 0,97 g de glucose et 1.44 g de saccharose par pastille. Ceci est à prendre en compte pour les patients atteints de diabète sucré.

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ce médicament contient 3 mg de propylène glycol dans chaque pastille.

Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par dose, c'est-à-dire qu'il est essentiellement «sans sodium».

3. Comment utiliser Strepsils Vit C Orange ?

Veuillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose minimale efficace doit être utilisée pour la période la plus courte possible nécessaire pour soulager les symptômes.

Mal de gorge peut être un indice d'une autre affection grave, dès lors il est conseillé de ne pas utiliser les pastilles plus de 3 à 4 jours sans avis médical.

La dose recommandée est de :

Adultes

Laisser fondre lentement une pastille dans la bouche toutes les 2 à 3 heures.

Prendre au maximum 6 pastilles par jour (24 heures).

Enfants

Enfants de 15 ans et plus: voir adultes

Enfants de 8 à 15 ans : 1 pastille 4 x par jour.

Enfants de 5 à 7 ans : 1 pastille 3 x par jour.

Si vous avez utilisé plus de Strepsils que vous n'auriez dû

Si vous avez pris trop de Strepsils, consultez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

En cas de surdosage, seule une gêne gastro-intestinale pourrait se présenter.

Etant donné la forme du produit, sa faible teneur en principes actifs et l'absence de toxicité de ceux-ci, pratiquement aucune conséquence n'est à redouter.

Le traitement est symptomatique

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Fréquence indéterminée

- Hypersensibilité sous forme d'éruption cutanée ; gonflement rapide sous la peau dans des zones telles que le visage, la gorge, les bras et les jambes, pouvant mettre la vie en danger si le gonflement de la gorge bloque les voies respiratoires ; éruption cutanée avec démangeaisons ; contraction excessive des muscles des voies respiratoires provoquant des difficultés respiratoires et une hypotension artérielle accompagnée d'évanouissements.
- Douleurs abdominales, nausée, inconfort oral come sensation de brûlure ou picotement dans la bouche ou la gorge et gonflement de la bouche ou de la gorge.
- Eruption cutanée.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration:

Belgique :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

www.afmps.be

Division Vigilance :

Site internet : www.notifieruneffetindesirable.be

E-mail : adr@fagg-afmps.be

Luxembourg :

Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm, Tél.: (+352) 2478 5592, e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu
Link pour le formulaire :
<https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Strepsils Vit C Orange ?

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la plaquette et l'emballage après « exp ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Strepsils Vit C

- Les substances actives sont: 1,2 mg alcool dichlorobenzyle, 0,6 mg amylmétacrésol et 100 mg Vit C.
- Les autres composants sont arôme orange sanguine, menthol, propylène glycol, jaune orangé S (E110), ponceau 4R (E124), acide tartrique, saccharose et glucose liquides.

Qu'est-ce que Strepsils et contenu de l'emballage extérieur

Strepsils Vit C sont des pastilles rondes, oranges, conditionnées par 24 ou 36 sous plaquette en Alu/PVC/PVdC.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) SA/NV
Boulevard Industriel 13B
1070 Bruxelles

Fabricant

Reckitt Benckiser NL Brands B.V., Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, Pays-Bas

Numéro de l'Autorisation de Mise sur le Marché

BE146632, LU 2006078949

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 11/2025